

## Qu'est-ce que l'abiratérone ?

C'est une hormonothérapie indiquée en association avec la prednisone ou prednisolone dans le traitement du cancer de la prostate

## Où puis-je me procurer mon traitement ?

Disponible en **pharmacie de ville**

## Comment le conserver ?

Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

**Conserver hors de la portée des enfants**

## Comment dois-je le prendre ?

Prenez votre médicament **au moins deux heures après le repas** et ne mangez rien pendant **au moins une heure après la prise de ZYTIGA®**

- **ZYTIGA®** à prendre en **1 prise par jour**
- **Prednisone ou prednisolone** à prendre en **2 prises par jour** (matin et soir)
  - **Ne jamais arrêter** Prednisone ou Prednisolone **sans avis médical**



Si vous avez oublié une prise de médicament :

- **ne prenez pas la dose oubliée**
- **prenez la dose habituelle le jour suivant**
- noter l'oubli



## Consignes générales



Ne **jamais couper, écraser, ni mâcher** les comprimés



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Si vous avez des rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être, vous devez utiliser un préservatif ET une autre méthode efficace de contraception



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



**N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste**



**Eviter** l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis) et éviter la consommation de **pamplemousse** (jus ou pulpe) qui peuvent interagir avec les médicaments



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **immédiatement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)

## Brochure information Patient

# ZYTIGA® Abiratérone 250 mg Comprimés



**Mieux connaître son traitement**

### Contact

**Oncotel : 03.81.47.99.99**



*Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.*

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale de l'IRFC-FC

# ZYTIGA<sup>®</sup> abiratérone

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

## Effets indésirables potentiels principaux

Œdèmes, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque (rare)

Surveillance prise de sang : troubles hépato-biliaires et hypokaliémie

Infection urinaire

## Prévention



Mesurer régulièrement la tension, savoir reconnaître les signes : maux de tête, troubles de la vision, bourdonnements  
Surveillance du gonflement des jambes  
Limiter sa consommation en sel



En cas de symptômes contacter un médecin



Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin



Bien s'hydrater : 1,5 L d'eau par jour



En cas de brûlure urinaire, d'urine trouble, contacter un médecin



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre médecin

- **Ne jamais arrêter** la castration chimique (analogue de la LH-RH : DECAPEPTYL<sup>®</sup> ou ENANTONE<sup>®</sup> ou ELIGARD<sup>®</sup> ou ZOLADEX<sup>®</sup> ou FIRMAGON<sup>®</sup>)
- En cas de diabète, surveiller la glycémie