

## Qu'est-ce que axitinib ?

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement du cancer du rein

## Où puis-je me procurer mon traitement ?

Disponible en **pharmacie de ville**

## Comment le conserver ?

Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur

**Conserver hors de la portée des enfants**

## Comment dois-je le prendre ?

**En deux prises par jour, à 12h d'intervalle** tous les jours à la **même heure** avec un grand verre d'eau pendant ou en dehors des repas



En cas de vomissements ou d'oubli de prise:

- **ne prenez pas la dose oubliée**
- **prenez la dose habituelle le jour suivant**
- noter l'oubli



## Consignes générales



**Ne jamais couper, mâcher ou écraser** les comprimés



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



**N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste**



**Eviter** l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis) et éviter la consommation de **pamplemousse** (jus ou pulpe) qui peuvent interagir avec les médicaments



Inlyta peut altérer la cicatrisation des plaies  
En cas d'intervention chirurgicale programmée, parlez-en à votre médecin



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)

## Brochure information Patient

# INLYTA<sup>®</sup> Axitinib 1/3/5/7mg Comprimés



## Mieux connaître son traitement

### Contact

**Oncotel : 03.81.47.99.99**



*Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.*

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale de l'IRFC-FC

# INLYTA<sup>®</sup> axitinib

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

## Effets indésirables potentiels principaux

### Digestif

- Nausées, vomissements
- Diarrhées
- Mucite

### Hypertension artérielle

### Syndrome main-pied

### Altération de la cicatrisation

### Dysphonie

### Saignements

### Fatigue

### Bilan hépatique et thyroïdien perturbés (jaunisse)

## Prévention



Faire plusieurs repas légers et éviter les aliments frits, épicés et gras



Ne pas reprendre la prise si vomissements



Eviter le café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus et l'alcool  
Réhydratation



En cas de diarrhées importantes contacter un médecin



Brosse à dent souple, dentifrice doux (sans menthol), éventuellement bain de bouche préventifs



Si douleurs trop importantes contacter un médecin



Mesurer régulièrement la tension, savoir reconnaître les signes : maux de tête, troubles de la vision, bourdonnements  
Limiter la consommation de sel



En cas de symptômes, contacter un médecin



Ne pas porter de chaussures serrées  
Eviter les frottements  
Utiliser un savon doux et une crème émolliente  
Surveiller la surinfection



En cas de gêne au quotidien, contacter un médecin



Avertir le médecin de la prise du traitement avant toute intervention programmée ou urgente



Eviter le tabac, les poussières, le froid, boire régulièrement pour hydrater les cordes vocales, repos vocal



Prudence avec anti-inflammatoires, aspirine, anticoagulants



Si syndrome hémorragique contacter un médecin



Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos



Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.