

Qu'est-ce que la lomustine?

C'est une chimiothérapie indiquée dans le traitement des tumeurs cérébrales

Où puis-je me procurer mon traitement ?

Disponible en **pharmacie hospitalière**

Comment le conserver?

Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.


Conserver hors de la portée des enfants

Comment dois-je le prendre ?

- Gélules à avaler en **1 seule prise** avec un **grand verre d'eau** de préférence **le soir au coucher**, ou **3 heures après un repas**
- La prise suivante aura lieu **6 semaines après**



Si vous avez oublié de prendre vos gélules de Belustine® le jour prévu :

- o **Prenez-les à l'heure habituelle le jour suivant** 
- o Noter l'oubli
- o Un délai de 6 semaines devant être respecté, la prise suivante devra être décalée d'une journée

Consignes générales



Ne pas ouvrir les gélules



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement. Toujours utiliser une méthode efficace de contraception, que vous soyez un homme ou une femme, cela **pendant le traitement et durant 6 mois après l'arrêt du traitement**



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



Eviter l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis) et éviter la consommation de **pampleousse** (jus ou pulpe) qui peuvent interagir avec les médicaments



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)

Brochure information Patient

BELUSTINE® Lomustine 40 mg Gélules



Mieux connaître son traitement

Contact

Oncotel : 03.81.47.99.99



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale de l'IRFC-FC

BELUSTINE[®] lomustine

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables potentiels principaux

Hématologique

- **Leucopénie = baisse des globules blancs**

- **Thrombopénie = baisse des plaquettes**

Nausées/vomissements

Prévention



Surveiller les signes d'infections (fièvre, toux, brûlures urinaires), limiter les contacts avec les personnes malades, lavage des mains, désinfection des plaies, hygiène buccale



Prudence avec anti-inflammatoires, aspirine, anticoagulants



Si fièvre supérieure à 38°C, contacter un médecin



Si saignements, contacter un médecin



Faire plusieurs repas légers et éviter les aliments frits, épicés et gras



Ne pas reprendre la prise si vomissements



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.