

Qu'est-ce que le dabrafénib ?

C'est une thérapie ciblée indiquée pour le traitement du mélanome

Où puis-je me procurer mon traitement ?

Disponible en **pharmacie de ville**

Comment le conserver?

Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Conserver hors de la portée des enfants

Comment dois-je le prendre ?

En **2 prises par jour**, à **12h d'intervalle** tous les jours à la **même heure** avec un verre d'eau en **dehors des repas** : **1 avant ou 2h après** un repas



Si vous avez oublié une prise de médicament :



Il reste + de 6h avant la prochaine prise

→ Prenez la dose oubliée



Il reste - de 6h avant la prochaine prise

→ Ne prenez pas la dose oubliée

Consignes générales



Ne **jamais couper, écraser, ni mâcher** les gélules



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace pendant la durée du traitement et jusqu'à 4 mois après la fin du traitement



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêter jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



Attention à l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis)

→ **Risque d'interactions médicamenteuses**



Ne pas consommer de pamplemousse (jus ou pulpe)



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **immédiatement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)

Brochure information Patient

TAFINLAR® Dabrafénib 50 et 75 mg Gélules



Mieux connaître son traitement



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale

TAFINLAR® dabrafénib

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Principaux effets indésirables potentiels

Digestif

- **Nausées/vomissements, perte d'appétit**
- **Diarrhées**

Cutané

- **Eruption cutanée**
- **Syndrome main-pieds**
- **Perte de cheveux**

Douleurs musculaires, douleurs articulaires, maux de tête

Fatigue

Toux

Prévention



Faire plusieurs repas légers et éviter les aliments frits, épicés et gras



Ne pas reprendre la prise si vomissements



Eviter le café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus et l'alcool
Réhydratation



En cas de diarrhées importantes contacter un médecin



Limitez l'exposition au soleil, portez des vêtements couvrants, appliquez un produit solaire d'indice/coefficient de protection > 50 avant exposition et toutes les 2 heures si besoin



En cas de réactions importantes, contacter un médecin



Ne pas porter de chaussures serrées
Eviter les frottements



En cas de gêne au quotidien, contacter un médecin



Utiliser un savon doux et une crème émolliente
Surveiller la surinfection



Utiliser une brosse molle et un shampooing doux. Se laver les cheveux à distance de la prise des gélules



S'hydrater fréquemment, limiter les gestes répétitifs et privilégier les exercices légers (marche)



Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos



Surveiller l'apparition de symptômes



En cas de symptômes, contacter un médecin



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.