

Qu'est-ce que le dasatinib?

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement de la **LMC chromosome Ph+** ou de la **LAL** en cas de résistance à un traitement antérieur.

Où puis-je me procurer mon traitement ?

Disponible en **pharmacie de ville**


Comment le conserver ?


Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur

Conserver hors de la portée des enfants

Comment dois-je le prendre ?

La posologie est strictement personnelle. L'administration se fait en **1 prise** par jour, **pendant ou en dehors** des repas, tous les jours à la même heure.

 Si vous avez oublié une prise de médicament :

- o **ne prenez pas la dose oubliée**
- o **prenez la dose habituelle le jour suivant**
- o noter l'oubli 

Consignes générales



Ne pas écraser, couper ou sucer les comprimés



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace **pendant le traitement**



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêter jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



Eviter l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis) et éviter la consommation de **pamplemousse** (jus ou pulpe) qui peuvent interagir avec les médicaments



Brochure information Patient

SPRYCEL®

Dasatinib

20-50-70-100-140 mg

Comprimés



Mieux connaître son traitement

Contacts

Médecin : Dr _____

03.81.66.82.32



















Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'hématologie

SPRYCEL® Dasatinib

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Principaux effets indésirables potentiels	Prévention	
Digestif - Nausées, vomissements - Diarrhées	 Faire plusieurs repas et éviter les aliments frits, épicés et gras.  Eviter le café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus et l'alcool Réhydratation	 Ne pas reprendre la prise si vomissement  En cas de diarrhées importantes contacter un médecin
Eruptions cutanées, photosensibilisation, perte de cheveux	 Utiliser un savon doux et une crème émolliente Surveiller la surinfection  Eviter les expositions au soleil et utiliser un écran solaire total  Utiliser une brosse molle et un shampooing doux	 En cas de gêne au quotidien, contacter un médecin  Se couper les cheveux courts Prothèse capillaire Parlez-en avec votre médecin
Œdèmes, douleurs dans les jambes	 Dormir les jambes surélevées, marcher, Alimentation à faible teneur en sel, Surveillance de votre poids  Utiliser des chaussettes de contention veineuse	 Si prise de poids rapide et inattendue, contacter un médecin
Douleurs musculaires, articulaires, maux de tête	 S'hydrater régulièrement Eviter les mouvements répétitifs et les efforts physiques importants	
Troubles hématologiques (thrombopénie, neutropénie)	 Limiter les contacts avec les personnes malades Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin	
Difficultés à respirer, toux	 Surveiller l'apparition de symptômes	 En cas de symptômes contacter un médecin



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.