

Qu'est-ce que l'enzalutamide ?

C'est une hormonothérapie indiquée dans le traitement du cancer de la prostate

Où puis-je me procurer mon traitement ?

Disponible en **pharmacie de ville**

Comment le conserver ?

Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Conserver hors de la portée des enfants

Comment dois-je le prendre ?

En une prise par jour, tous les jours à la **même heure** avec un grand verre d'eau pendant ou en dehors des repas



En cas de vomissements ou d'oubli d'une prise de médicament :

- **ne prenez pas la dose oubliée**
- **prenez la dose habituelle le jour suivant**
- noter l'oubli



Consignes générales



Ne **jamais couper, écraser, ni mâcher** les capsules



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Si vous avez des rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être, vous devez utiliser un préservatif **ET** une autre méthode efficace de contraception, cela **pendant le traitement et durant 3 mois après l'arrêt du traitement**



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



Eviter l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis) et éviter la consommation de **pampleousse** (jus ou pulpe) qui peuvent interagir avec les médicaments



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)

Brochure information Patient

XTANDI® Enzalutamide 40 mg Capsule



Mieux connaître son traitement

Contact

Oncotel : 03.81.47.99.99



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale de l'IRFC-FC

XTANDI® enzalutamide

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables potentiels principaux

Céphalées modérées
Bouffées de chaleur

Fatigue

Risque de convulsions (très rare)

Prévention



Hydratation correcte (1,5L d'eau par jour)



Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos



En cas de survenue de convulsions, contacter le 15



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre médecin

- **Ne jamais arrêter** la castration chimique (analogue de la LH-RH : DECAPEPTYL® ou ENANTONE® ou ELIGARD® ou ZOLADEX® ou FIRMAGON®)
- **En cas de prescription de nouveaux médicaments, demander conseil au médecin ou au pharmacien → risque d'interactions médicamenteuses**