

Qu'est-ce que l'étoposide?

C'est une chimiothérapie indiquée dans le traitement :

- des tumeurs germinales
- du cancer du sein
- du cancer bronchique
- du lymphome
- des leucémies aiguës
- autres

Où puis-je me procurer mon traitement ?

Disponible en **pharmacie de ville**

Comment le conserver?

Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur

Conserver hors de la portée des enfants

Comment dois-je le prendre ?

Prise avec un grand verre d'eau **pendant ou en dehors** d'un repas en **2 à 3 prises** par jour

Posologie selon l'indication



Si vous avez oublié une prise de médicament :

- **ne prenez pas la dose oubliée**
- **prenez la dose habituelle le jour suivant**
- noter l'oubli



Consignes générales



Ne **jamais mâcher, sucer, écraser ou couper** les capsules



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels pendant le traitement



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



Eviter l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis) et éviter la consommation de **pampleousse** (jus ou pulpe) qui peuvent interagir avec les médicaments



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)

Brochure information Patient

CELLTOP[®] Étoposide 25, 50 et 100mg Capsules



Mieux connaître son traitement

Contact

Oncotel : 03.81.47.99.99



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale de l'IRFC-FC

CELLTOP[®] étoposide

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables potentiels principaux

Digestif

- Nausées, vomissements

- Mucites

Hématologique

- Leucopénie

- Anémie

- Thrombopénie

Perte de cheveux

Prévention



Faire plusieurs repas légers et éviter les aliments frits, épicés et gras



Ne pas reprendre la prise si vomissements



Eviter les aliments acides, épicés, irritants
Bonne hygiène buccale : utiliser une brosse à dent souple, un dentifrice doux et éventuellement des bains de bouche préventifs



Si douleurs trop importantes contacter un médecin



Surveiller les signes d'infections (fièvre, toux, brûlures urinaires)



Si fièvre supérieure ou égale à 38°C, contacter un médecin



Limiter les contacts avec les personnes malades, lavage des mains, désinfection des plaies, hygiène buccale



Equilibre alimentaire



Si fatigue trop importante, contacter un médecin



Prudence avec les anti-inflammatoires, aspirine, anticoagulants



Si syndrome hémorragique, contacter un médecin



Se laver les cheveux à distance de la prise des capsules, se couper les cheveux courts
Prothèse capillaire
Effet réversible à la fin du traitement



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.