

Qu'est-ce que ibrutinib ?

C'est un antinéoplasique indiqué dans **leucémie lymphoïde chronique (LLC)** et dans le **lymphome à cellules du manteau (LCM)**

Où puis-je me procurer mon traitement ?

Disponible en **pharmacie de ville**

Comment le conserver ?


Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur

Conserver hors de la portée des enfants

Comment dois-je le prendre ?

- La posologie est strictement personnelle
- L'administration se fait en **1 prise** par jour, **avec un grand verre d'eau**, à la même heure tous les jours.

?? Si une dose n'est pas prise à l'heure habituelle :

- o celle-ci **peut être prise dès que possible** le jour même
- o Ne pas doubler la dose
- o **le jour suivant, prenez la dose habituelle à l'heure habituelle**
- o noter l'incident 

Consignes générales



Ne pas ouvrir les gélules



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace **pendant le traitement et jusqu'à 3 mois après la fin du traitement**. Une méthode de **contraception mécanique** (préservatif) doit être ajoutée.



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêter jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



Eviter l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis) et éviter la consommation de **pampleousse** (jus ou pulpe) qui peuvent interagir avec les médicaments



Brochure information Patient

IMBRUVICA® Ibrutinib 140 mg Gélules



Mieux connaître son traitement

Contacts

Médecin : Dr _____

03.81.66.82.32



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'hématologie

IMBRUVICA® Ibrutinib

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Principaux effets indésirables potentiels

Digestif

- Diarrhées
- Constipation
- Nausées / vomissements

Eruptions cutanées, rougeur, acné, sécheresse de la peau

Fatigue

Douleurs musculaires, articulaires, maux de tête

Œdèmes, douleurs dans les jambes

Toux, difficultés à respirer

Troubles hématologiques (anémie, thrombopénie, neutropénie)

Trouble du rythme cardiaque

Prévention



Eviter le café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus et l'alcool
Réhydratation



En cas de diarrhées importantes contacter un médecin



Boire régulièrement de l'eau (Eau d'Hépar par exemple)
Eviter les pâtes et le riz



Faire plusieurs repas légers et éviter les aliments frits, épicés et gras



Ne pas reprendre la prise si vomissements



Utiliser un savon doux et une crème émoulliente
Surveiller la surinfection



En cas de gêne au quotidien, contacter un médecin



Eviter les expositions au soleil et utiliser un écran solaire total



Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos



S'hydrater régulièrement
Eviter les mouvements répétitifs et les efforts physiques importants



Dormir les jambes surélevées, marcher, Alimentation à faible teneur en sel,



Si prise de poids rapide et inattendue, contacter un médecin



Surveillance de votre poids
Utiliser des chaussettes de contention veineuse



Surveiller l'apparition de symptômes



En cas de symptômes contacter un médecin



Limiter les contacts avec les personnes malades
Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin

Surveillance de la tension



Contactez votre médecin en cas de palpitation



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.