

Qu'est-ce que imatinib?

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement :

- de la LMC ou LAL chromosome Ph+
- des tumeurs stromales gastro-intestinales
- du syndrome hyperéosinophilique /leucémie à éosinophiles
- des syndromes myéloprolifératifs ou myélodysplasiques
- du dermatofibrosarcome

Où puis-je me procurer mon traitement ?

Disponible en **pharmacie de ville**

Comment le conserver?

Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Conserver hors de la portée des enfants

Comment dois-je le prendre ?

Avec un grand verre d'eau **pendant** un repas :

- 1 **prise/jour** pour les doses **jusqu'à 600mg au cours** du plus gros **repas** de la journée
- 2 **prises/jour** matin et soir pour les doses **supérieures à 600mg**

En cas de **difficultés de déglutition**, les comprimés peuvent être dispersés dans de l'eau ou du jus de pomme

Eviter de s'allonger immédiatement après la prise

Consignes générales



Ne **jamais couper, écraser, ni mâcher** les comprimés



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



Eviter l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis) et éviter la consommation de **pampleousse** (jus ou pulpe) qui peuvent interagir avec les médicaments



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Si vous avez oublié une prise de médicament :

- o **ne prenez pas la dose oubliée**
- o **prenez la dose habituelle le jour suivant**
- o noter l'oubli

Brochure information Patient

GLIVEC® Imatinib 100 et 400mg Comprimés



Mieux connaître son traitement

Contact

Oncotel : 03.81.47.99.99



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale de l'IRFC-FC

GLIVEC® imatinib

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables potentiels principaux

Digestif

- Nausées/vomissements, perte d'appétit
- Diarrhées

Eruptions cutanées

Œdème des membres

Troubles oculaires (conjonctivite, démangeaisons, larmoiements)

Troubles hématologiques (anémie, thrombopénie, neutropénie)

Crampes musculaires, douleurs musculaires

Difficultés à respirer, toux

Prévention



Faire plusieurs repas légers et éviter les aliments frits, épicés et gras



Ne pas reprendre la prise si vomissements



Eviter le café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus et l'alcool
Réhydratation



En cas de diarrhées importantes contacter un médecin



Eviter les frottements, utiliser un savon doux et une crème émolliente



En cas de gêne au quotidien contacter un médecin



Eviter les expositions au soleil et utiliser un écran solaire total
Surveiller l'apparition de symptômes



Alimentation à faible teneur en sel, éviter les vêtements serrés, surveiller son poids, élever les pieds en position assise



Si prise de poids rapide et inattendue contacter un médecin



Eviter une atmosphère trop sèche ou enfumée, les longues durées devant l'ordinateur



Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin



Eviter les mouvements répétitifs et les efforts physiques importants, bien s'hydrater (1,5L d'eau/jour)



Surveiller l'apparition de symptômes



En cas de symptômes contacter un médecin



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.