

Qu'est-ce c'est ?

Association indiquée dans le traitement du cancer du sein

Où puis-je me procurer mon traitement ?

Disponible en **pharmacie de ville**

Comment le conserver ?

Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur

Conserver hors de la portée des enfants


Comment dois-je le prendre ?

TYVERB : 1 prise par jour 1h avant un repas



**XELODA : 2 prise par jour (matin et soir)
30min après le repas**

En continu pendant 14 jours, suivi d'une période de 7 jours sans traitement



Consignes générales



Ne pas couper les comprimés, ni les écraser



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels pendant la durée du traitement



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



Eviter l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis) et éviter la consommation de **pamplemousse** (jus ou pulpe) qui peuvent interagir avec les médicaments



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Si vous avez oublié une prise de médicament :

- **ne prenez pas la dose oubliée**
- **prenez la dose habituelle le jour suivant**
- noter l'oubli dans votre carnet

Brochure information Patient

TYVERB®-XELODA® Lapatinib-Capécitabine 250mg / 150 et 500mg Comprimés



Mieux connaître son traitement

Contact

Oncotel : 03.81.47.99.99



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale de l'IRFC-FC

TYVERB[®]-XELODA[®] lapatinib-capécitabine

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables potentiels principaux

Digestif

- Nausées, vomissements,
- Diarrhées
- Stomatite
- Anorexie

Fatigue

Cutané

- Rash, dermatite acnéiforme, sécheresse, syndrome main-pied

Cardiaque

Prévention



Faire plusieurs repas légers et éviter les aliments frits, épicés et gras



Ne pas reprendre la prise si vomissements



Eviter le café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus et l'alcool
Réhydratation



En cas de diarrhées importantes contacter un médecin



Brosse à dent souple, dentifrice doux (sans menthol), éventuellement bain de bouche préventifs



Si douleurs trop importantes contacter un médecin



Fractionner les repas, discuter compléments alimentaires à la prochaine consultation



Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos



Ne pas porter de chaussures serrées
Eviter les frottements, le soleil, l'eau chaude
Utiliser un savon doux et une crème émolliente
Surveiller la surinfection



En cas de gêne au quotidien contacter un médecin



En cas de douleur cardiaque, contacter un médecin



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.