

## Qu'est-ce que le lapatinib ?

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement du cancer du sein métastatique avec surexpression de HER2, en association avec la capécitabine ou avec le trastuzumab ou avec un anti-aromatase

## Où puis-je me procurer mon traitement ?

Disponible en **pharmacie de ville**

## Comment le conserver?

Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur

**Conserver hors de la portée des enfants**

## Comment dois-je le prendre ?

**1h avant un repas en 1 prise**

Association à la capécitabine :  
2500mg soit **5 cp** de Tyverb® en continu

Association à un anti-aromatase :  
1500mg soit **6 cp** en une prise par jour en continu

Association au trastuzumab :  
1000mg soit **4 cp** en une prise par jour en continu

## Consignes générales



Ne pas couper les comprimés, ni les écraser



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



**N'arrêter jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste**



**Evitez** l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis) et éviter la consommation de **pamplemousse** (jus ou pulpe) qui peuvent interagir avec les médicaments



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Si vous avez oublié une prise de médicament :

- **ne prenez pas la dose oubliée**
- **prenez la dose habituelle le jour suivant**
- noter l'oubli dans votre carnet



## Brochure information Patient

# TYVERB® Lapatinib 250mg Comprimés



## Mieux connaître son traitement

### Contact

**Oncotel : 03.81.47.99.99**



*Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.*

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale de l'IRFC-FC

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

## Principaux effets indésirables potentiels

### Digestif

- Nausées, vomissements,
- Diarrhées
- Stomatite
- Anorexie

### Fatigue

### Cutané

- Rash, dermatite acnéiforme, sécheresse, syndrome main-pied

### Cardiaque

## Prévention



Faire plusieurs repas légers et éviter les aliments frits, épicés et gras



Ne pas reprendre la prise si vomissements



Eviter le café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus et l'alcool  
Réhydratation



En cas de diarrhées importantes contacter un médecin



Brosse à dent souple, dentifrice doux (sans menthol), éventuellement bain de bouche préventifs



Si douleurs trop importantes contacter un médecin



Fractionner les repas, discuter compléments alimentaires à la prochaine consultation



Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos



Ne pas porter de chaussures serrées  
Eviter les frottements, le soleil, l'eau chaude  
Utiliser un savon doux et une crème émolliente  
Surveiller la surinfection



En cas de gêne au quotidien contacter un médecin



En cas de douleur cardiaque, contacter un médecin



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.