

Qu'est-ce que le tramétinib?

C'est une thérapie ciblée indiquée en dans le traitement du mélanome

Où puis-je me procurer mon traitement ?

Disponible en **pharmacie de ville**

Comment le conserver?

Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Conserver hors de la portée des enfants

Comment dois-je le prendre ?

En 1 prise par jour, tous les jours à la **même heure** avec un verre d'eau en **dehors des repas** : **1 avant ou 2h après** un repas



Si vous avez oublié une prise de médicament :



Il reste + de 12h avant la prochaine prise

→ Prenez la dose oubliée



Il reste - de 12h avant la prochaine prise

→ Ne prenez pas la dose oubliée

Consignes générales



Ne **jamais couper, écraser, ni mâcher** les comprimés



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace pendant la durée du traitement et jusqu'à 3 mois après la fin du traitement



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêter jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



Attention à l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis)

→ **Risque d'interactions médicamenteuses**



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **immédiatement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)

Brochure information Patient

MEKINIST® Tramétinib 0,5/1/2 mg Comprimés



Mieux connaître son traitement


















Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale

MEKINIST® tramétinib

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables potentiels principaux	Prévention	
Digestif <ul style="list-style-type: none">- Nausées/vomissements- Diarrhées- Constipation	 Faire plusieurs repas légers et éviter les aliments frits, épicés et gras  Eviter le café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus et l'alcool Réhydratation  Boire régulièrement de l'eau, faire des exercices légers Eviter les pâtes et le riz	 Ne pas reprendre la prise si vomissements  En cas de diarrhées importantes contacter un médecin
Cutané <ul style="list-style-type: none">- Eruption cutanée, acné, sécheresse cutanée, prurit	 Eviter les frottements, le soleil, l'eau chaude Préférer un savon doux 	 En cas de réaction importante, contacter un médecin
Hypertension artérielle	 Mesurer régulièrement la tension, savoir reconnaître les signes : maux de tête, troubles de la vision, bourdonnements Limiter la consommation de sel	 En cas de symptômes, contacter un médecin
Toux, difficultés à respirer	 Surveiller l'apparition de symptômes	 En cas de symptômes, contacter un médecin
Fièvre	 Si fièvre supérieure ou égale à 38°C, contacter un médecin	
Fatigue	 Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos	
Perturbation du bilan hépatique	 Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin	

 Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.