

### Qu'est-ce que mercaptopurine ?

C'est un antinéoplasique utilisé dans le traitement des **leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL)**, **myéloblastiques (LAM)** ou dans les **leucémies myéloïdes chroniques (LMC)**.

### Où puis-je me procurer mon traitement ?

Disponible en **pharmacie de ville**

### Comment le conserver ?


Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.


**Conserver hors de la portée des enfants.**

### Comment dois-je le prendre ?

La posologie est strictement personnelle.

Les comprimés sont à prendre avec un grand verre d'eau en **1 prise/jour**, à **l'heure du coucher**, à **distance de produits laitiers**.

 Si vous avez oublié une prise de médicament :

- o **ne prenez pas la dose oubliée**
- o **prenez la dose habituelle le jour suivant**
- o noter l'oubli 

### Consignes générales



Ne **jamais couper**, **écraser**, ni **mâcher** les comprimés



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement.

Utiliser une méthode de contraception efficace **pendant le traitement et minimum jusqu'à 1 an après**



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



**N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste**



**Eviter** l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis) et éviter la consommation de **pampleousse** (jus ou pulpe) qui peuvent interagir avec les médicaments



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée (60-90°C)**

### Brochure information Patient

# PURINETHOL® Mercaptopurine 50 mg Comprimés



## Mieux connaître son traitement

### Contacts

Médecin : Dr \_\_\_\_\_

**03.81.66.82.32**



*Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.*

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'hématologie

# PURINETHOL<sup>®</sup> Mercaptopurine

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

## Effets indésirables potentiels principaux

### Digestifs (rare)

- **Nausées/vomissements, perte d'appétit**
- **Diarrhées**
- **Mucite**

**Troubles hématologiques (anémie, thrombopénie, neutropénie) et perturbation bilan biologique hépatique**

**Fatigue**

**Aménorrhée, azoospermie**

## Prévention



Faire plusieurs repas légers et éviter les aliments frits, épicés et gras



Ne pas reprendre la prise si vomissements



Eviter le café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus et l'alcool  
Réhydratation



En cas de diarrhées importantes contacter un médecin



Brosse à dent souple, dentifrice doux (sans menthol), éventuellement bain de bouche préventifs



Si douleurs trop importantes contacter un médecin



Limiter les contacts avec les personnes malades  
Boire d'avantage d'eau pour maintenir le bon fonctionnement du rein  
Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin



Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos

Ne sont que transitoires



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.