

Qu'est-ce que Midostaurine ?

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement de la **leucémie à mastocytes**, la **mastocytose systémique agressive** et de la **leucémie aigüe myéloïde** avec présence d'une mutation du gène FLT3.

Où puis-je me procurer mon traitement ?

Disponible en **pharmacie hospitalière**

Comment le conserver ?

Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur. **Conserver hors de la portée des enfants.**

Comment dois-je le prendre ?

La posologie est strictement personnelle. Les comprimés sont à avaler avec un grand verre d'eau, en **2 prises par jour à environ 12 heures d'intervalle**, aux mêmes heures chaque jour et **pendant le repas.**

?? Si vous avez oublié une prise de médicament :

- o **ne prenez pas la dose oubliée**
- o **prenez la dose habituelle lors de la prise suivant**
- o noter l'oubli 

Consignes générales



Ne pas ouvrir les gélules



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement.

Pour les femmes ou les hommes en âge de procréer, utiliser une méthode de contraception efficace **pendant le traitement et jusqu'à 5 mois après la fin du traitement.**



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêter jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



Eviter l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis) et éviter la



consommation de **pamplemousse** qui peuvent interagir avec les médicaments

Brochure information Patient

Midostaurine 25 mg Gélules



Mieux connaître son traitement

Contacts

Médecin : Dr _____

03.81.66.82.32



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'hématologie

Midostaurine

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Principaux effets indésirables potentiels

Digestifs :

- **Nausées/vomissements, perte d'appétit**
- **Diarrhées**
- **Constipation**

Eruption cutanée, prurit

Troubles hématologiques (anémie, thrombopénie, neutropénie) et biologiques

Toux, infections respiratoires

Fatigue

Troubles cardiaques, palpitations

Prévention



Faire plusieurs repas légers et éviter les aliments frits, épicés et gras



Ne pas reprendre la prise si vomissements



Eviter le café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus et l'alcool
Réhydratation



En cas de diarrhées importantes contacter un médecin



Boire régulièrement de l'eau (Eau d'Hépar par exemple)
Eviter les pâtes et le riz



Utiliser un savon doux et une crème émolliente
Surveiller la surinfection



En cas de gêne au quotidien, contacter un médecin



Eviter les expositions au soleil et utiliser un écran solaire total



Limiter les contacts avec les personnes malades
Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin
Bien boire 1,5L d'eau par jour



Surveiller l'apparition de symptômes



En cas de symptômes contacter un médecin



Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos



Surveiller l'apparition de symptômes

En cas de symptômes contacter un médecin



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.