

Qu'est-ce que le pazopanib?

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement :

- du cancer du rein
- de certains sarcomes

Où puis-je me procurer mon traitement ?

Disponible en **pharmacie de ville**

Comment le conserver?

Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité.

Conserver hors de la portée des enfants.

Comment dois-je le prendre ?

En une prise par jour, tous les jours à la **même heure** avec un grand verre d'eau **1h avant ou 2h après un repas**

?? Si vous avez oublié une prise de médicament :

- **ne prenez pas la dose oubliée**
- **prenez la dose habituelle le jour suivant**
- noter l'oubli



Consignes générales



Ne **jamais mâcher, sucer, écraser ou couper** les comprimés



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace **pendant la durée du traitement et durant 2 semaines après l'arrêt du traitement**



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste.



Eviter l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis) et éviter la consommation de **pamplemousse** (jus ou pulpe) qui peuvent interagir avec les médicaments



Votrient® peut altérer la cicatrisation des plaies. En cas d'intervention chirurgicale programmée, parlez-en à votre médecin



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)

Brochure information Patient

VOTRIENT® pazopanib 200 et 400mg comprimés



Mieux connaître son traitement

Contact

Oncotel : 03.81.47.99.99



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale de l'IRFC-FC

VOTRIENT[®] pazopanib

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables potentiels principaux

Digestif

- Nausées/vomissements
- Diarrhées
- Mucite

Hypertension artérielle

Syndrome main-pied

Altération de la cicatrisation

Bilan hépatique et thyroïdien perturbés

Saignements

Fatigue

Modification de la couleur des cheveux

Prévention



Faire plusieurs repas légers et éviter les aliments frits, épicés et gras



Ne pas reprendre la prise si vomissements



Eviter le café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus et l'alcool
Réhydratation



En cas de diarrhées importantes contacter un médecin



Brosse à dent souple, dentifrice doux (sans menthol), éventuellement bain de bouche sans alcool



Si douleurs trop importantes contacter un médecin



Mesurer régulièrement la tension, savoir reconnaître les signes : maux de tête, troubles de la vision, bourdonnements
Limiter la consommation de sel



En cas de symptômes, contacter un médecin



Ne pas porter de chaussures serrées
Eviter les frottements
Utiliser un savon doux et une crème émolliente
Surveiller la surinfection



En cas de gêne au quotidien, contacter un médecin



Avertir le médecin de la prise du traitement avant toute intervention programmée ou urgente



Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin



Prudence avec AINS, aspirine, anticoagulants



Si syndrome hémorragique contacter un médecin



Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos

Réversible à l'arrêt du traitement



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.