

Qu'est-ce que le protocole PCV?

C'est un protocole indiqué dans le traitement des tumeurs cérébrales

Où puis-je me procurer mon traitement ?

Belustine® = Lomustine : en pharmacie hospitalière

Natulan® = Procarbazine : en pharmacie de ville

Vincristine : injection à l'hôpital

Comment le conserver?

Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur. **Conserver hors de la portée des enfants**

Comment dois-je le prendre ?

- **BELUSTINE® = Lomustine** : uniquement le **1^{er} jour** du cycle de traitement, **le soir au coucher** ou **3h après 1 repas**

- **NATULAN® = Procarbazine** : du **8^{ème} jour au 21^{ème} jour** du cycle soit 14 jours de traitement, **pendant ou en dehors d'un repas**

- **Vincristine** : injection le **8^{ème}** et le **29^{ème}** jour du cycle

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42

Reprise du cycle à J1

Consignes générales



Ne **jamais ouvrir**, ni **mâcher**, ni **sucer** les gélules



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement. Toujours utiliser une méthode de contraception efficace, que vous soyez un homme ou une femme, **pendant le traitement et pendant 6 mois après l'arrêt du traitement**



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



Eviter l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis) et éviter la consommation de **pampleousse** (jus ou pulpe) qui peuvent interagir avec les médicaments



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



En cas d'oubli de prise :

- **ne prenez pas la dose oubliée**
- **prenez la dose habituelle le jour suivant**
- noter l'oubli

Brochure information Patient

Protocole PCV Procarbazine CCNU = Lomustine Vincristine



Mieux connaître son traitement

Contact

Oncotel : 03.81.47.99.99



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale de l'IRFC-FC

Protocole PCV

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables potentiels principaux

Digestif

- **Nausées/vomissements**
- **Mucite, aphtes**
- **Constipation**

Hématologique

- **Leucopénie = baisse des globules blancs**
- **Thrombopénie = baisse des plaquettes**

Picotements, fourmillements, sensation de brûlure dans les bras ou les jambes

Fatigue

Prévention



Faire plusieurs repas légers et éviter les aliments frits, épicés et gras



Ne pas reprendre la prise si vomissements



Brosse à dent souple, dentifrice doux (sans menthol), éventuellement bain de bouche préventifs



Si douleurs trop importantes contacter un médecin



Boire au moins 2L d'eau par jour, alimentation riche en fibres (légumes verts, fruits), éviter les pâtes et le riz, faire de l'exercice physique



Consulter un médecin si persistance des symptômes



Surveiller les signes d'infections (fièvre, toux, brûlures urinaires), limiter les contacts avec les personnes malades, lavage des mains, désinfection des plaies, hygiène buccale



Si fièvre supérieure à 38°C, contacter un médecin



Prudence avec anti-inflammatoires, aspirine, anticoagulants



Si syndrome hémorragique contacter un médecin



En cas de symptômes, parlez-en à votre médecin



Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos

 **Ne pas boire d'alcool avec NATULAN® même en faible quantité → risque de malaise, vomissements**

 Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.