

### Qu'est-ce que le régorafénib ?

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement :

- du cancer colorectal
- de tumeurs stromales gastro-intestinales

### Où puis-je me procurer mon traitement ?

Disponible en **pharmacie de ville**

### Comment le conserver ?

Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité.  
**Conserver hors de la portée des enfants**

### Comment dois-je le prendre ?

En une **prise par jour**, tous les jours à la **même heure** avec un grand verre d'eau après un repas pauvre en graisses

En **continu pendant 21 jours** suivi d'une **pause de 7 jours**



En cas d'**oubli d'une prise**, la **dose** doit être prise le même jour, **dès que vous vous apercevez de l'oubli**

**Ne pas reprendre de comprimés en cas de vomissements**

### Consignes générales



Ne **jamais couper, écraser**, les comprimés



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Utiliser une méthode de contraception efficace **pendant le traitement et durant 2 mois après l'arrêt du traitement**



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



**N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste**



**Eviter** l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis) et éviter la consommation de **pampleousse** (jus ou pulpe) qui peuvent interagir avec les médicaments



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomisements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)

### Brochure information Patient

# STIVARGA<sup>®</sup> régorafénib 40 mg comprimés



## Mieux connaître son traitement

### Contact

**Oncotel : 03.81.47.99.99**



*Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.*

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale de l'IRFC-FC

# STIVARGA® régorafénib

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

## Effets indésirables potentiels principaux

### Digestif

- Diminution de l'appétit
- Diarrhées

### Hypertension artérielle

### Syndrome main-pied

### Fatigue

### Dysphonie

## Prévention



Varier son alimentation, écouter ses envies, faire plusieurs repas légers



Eviter le café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus et l'alcool  
Réhydratation



En cas de diarrhées importantes contacter un médecin



Mesurer régulièrement la tension, savoir reconnaître les signes : maux de tête, troubles de la vision, bourdonnements  
Limiter la consommation de sel



En cas de symptômes, contacter un médecin



Ne pas porter de chaussures serrées  
Eviter les frottements



Utiliser un savon doux et une crème émolliente  
Surveiller la surinfection



En cas de gêne au quotidien, contacter un médecin



Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos



Eviter le tabac, les poussières, le froid, boire régulièrement pour hydrater les cordes vocales, repos vocal



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.