

## Qu'est-ce que sorafenib ?

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement :

- du cancer du rein
- du cancer du foie
- du cancer de la thyroïde

## Où puis-je me procurer mon traitement ?

Disponible en **pharmacie de ville**

## Comment le conserver ?

Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

**Conserver hors de la portée des enfants**

## Comment dois-je le prendre ?

**En 2 prises par jour** (2 comprimés matin et soir), tous les jours à la **même heure** avec un grand verre d'eau **en dehors des repas ou avec un repas pauvre en graisses**

En cas de **repas riche en graisses**, prendre Nexavar® **1h avant ou 2h après le repas**



Si vous avez oublié une prise de médicament :

- **ne prenez pas la dose oubliée**
- **prenez la dose habituelle le jour suivant**
- noter l'oubli 

## Consignes générales



Ne **jamais mâcher, sucer, écraser ou couper** les comprimés



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



**N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste**



**Eviter** l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis) et éviter la consommation de **pamplemousse** (jus ou pulpe) qui peuvent interagir avec les médicaments



Nexavar peut altérer la cicatrisation des plaies. En cas d'intervention chirurgicale programmée, parlez-en à votre médecin



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée (60-90°C)**

## Brochure information Patient

# NEXAVAR® Sorafenib 200mg comprimés



## Mieux connaître son traitement

### Contact

**Oncotel : 03.81.47.99.99**



*Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.*

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale de l'IRFC-FC

# NEXAVAR® sorafénib

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

## Principaux effets indésirables potentiels

### Digestif

- Nausées/vomissements
- Diarrhées
- Mucite

### Hypertension artérielle

### Syndrome main-pied

### Altération de la cicatrisation

### Saignements

### Fatigue

## Prévention



Faire plusieurs repas légers et éviter les aliments frits, épicés et gras



Ne pas reprendre la prise si vomissements



Eviter le café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus et l'alcool  
Réhydratation



En cas de diarrhées importantes contacter un médecin



Brosse à dent souple, dentifrice doux (sans menthol), éventuellement bain de bouche préventifs



Si douleurs trop importantes contacter un médecin



Mesurer régulièrement la tension, savoir reconnaître les signes : maux de tête, troubles de la vision, bourdonnements  
Limiter la consommation de sel



En cas de symptômes, contacter un médecin



Ne pas porter de chaussures serrées  
Eviter les frottements  
Utiliser un savon doux et une crème émollissante  
Surveiller la surinfection



En cas de gêne au quotidien, contacter un médecin



Avertir le médecin de la prise du traitement avant toute intervention programmée ou urgente



Prudence avec anti-inflammatoires, aspirine, anticoagulants



Si syndrome hémorragique contacter un médecin



Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.