

### Qu'est-ce que le vandetanib ?

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement du cancer de la thyroïde

### Où puis-je me procurer mon traitement ?

Disponible en **pharmacie de ville**

### Comment le conserver ?

Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité  
**Conserver hors de la portée des enfants**

### Comment dois-je le prendre ?

**En une prise par jour**, tous les jours à la **même heure** avec un grand verre d'eau pendant ou en dehors des repas

Vous pouvez dissoudre le comprimé **UNIQUEMENT** dans de l'**eau non gazeuse**, **sans l'écraser** et **attendre la dissolution complète (10 min)**. **Rincez ensuite avec un demi-verre d'eau que vous boirez**

Si vous avez oublié une prise de médicament :



Il reste + de 6h avant la prochaine prise

→ Prenez la dose oubliée



Il reste - de 6h avant la prochaine prise

→ Ne prenez pas la dose oubliée

### Consignes générales



Ne **jamais mâcher, sucer, écraser ou couper** les comprimés



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une **contraception efficace pendant le traitement et pendant** au moins les **4 mois suivant la dernière dose**



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



**N'arrêter jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste.**



**Eviter** l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis) et éviter la consommation de **pamplemousse** (jus ou pulpe) qui peuvent interagir avec les médicaments



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **immédiatement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)

### Brochure information Patient

# CAPRELSA® Vandetanib 100 et 300mg comprimés



## Mieux connaître son traitement

### Contact

**Oncotel : 03.81.47.99.99**



*Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.*

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale de l'IRFC-FC

# CAPRELSA® vandetanib

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

## Effets indésirables potentiels principaux

**Hypertension artérielle**

**Digestif**

- **Nausées/vomissements**
- **Diarrhées**

**Cutané**

- **Eruption, acné, sécheresse de la peau, photosensibilité, syndrome main-pied**

**Toux, difficultés à respirer, essoufflement**

**Fatigue**

**Troubles oculaires**

## Prévention



Mesurer régulièrement la tension, savoir reconnaître les signes : maux de tête, troubles de la vision, bourdonnements  
Limiter la consommation de sel



En cas de symptômes, contacter un médecin



Faire plusieurs repas légers  
Eviter les aliments frits, épicés et gras



Eviter le café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus et l'alcool  
Réhydratation



En cas de diarrhées importantes contacter un médecin



Ne pas porter de chaussures serrées  
Eviter les frottements, le soleil, l'eau chaude  
Utiliser un savon doux et une crème émoulliente



En cas de gêne au quotidien contacter un médecin



Surveiller l'apparition de symptômes



En cas de symptômes, contacter un médecin



Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos



Evitez une atmosphère trop sèche ou enfumée, les longues durées devant l'ordinateur



Si vous ressentez des effets non mentionnés, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.