

Qu'est-ce que vénétoclax?

C'est un antinéoplasique indiqué dans le traitement de la **leucémie lymphoïde chronique (LLC)** en monothérapie.

Où puis-je me procurer mon traitement ?

Disponible en **pharmacie hospitalière**

Comment le conserver ?

Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur. **Conserver hors de la portée des enfants**

Comment dois-je le prendre ?

La posologie est strictement personnelle. Les comprimés sont à avaler avec un grand verre d'eau en **1 prise par jour**, à la même heure tous les jours, le **matin, pendant le repas**.

Semaine 1	20 mg par jour
Semaine 2	50 mg par jour
Semaine 3	100 mg par jour
Semaine 4	200 mg par jour
Semaine 5	400 mg par jour



Si vous avez oublié une prise de médicament :



Oubli de - 8h



Prenez la dose oubliée



Oubli de + de 8h



Ne prenez pas la dose oubliée et notez l'oubli



Consignes générales



Ne pas écraser, couper ou sucer les comprimés



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement.

Utiliser une méthode de contraception efficace (contraception mécanique en plus si prise d'une contraception hormonale) **pendant le traitement et jusqu'à 30 jours après la fin du traitement**



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêter jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



Éviter l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis) et éviter la consommation de **pamplemousse** et **carambole** (jus ou pulpe) qui peuvent interagir avec les médicaments



Brochure information Patient

VENCLYXTO® Vénétoclax 10, 50 et 100 mg Comprimés



Mieux connaître son traitement

Contacts

Médecin : Dr _____

03.81.66.82.32



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'hématologie

VENCLYXTO® Vénétoclax

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Principaux effets indésirables potentiels

Digestifs :

- **Nausées/vomissements, perte d'appétit**
- **Diarrhées**
- **Constipation**

Troubles hématologiques (anémie, thrombopénie, neutropénie) et biologiques

Toux, infections respiratoires

Fatigue

Prévention



Faire plusieurs repas légers et éviter les aliments frits, épicés et gras



Ne pas reprendre la prise si vomissements



Eviter le café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus et l'alcool
Réhydratation



En cas de diarrhées importantes contacter un médecin



Boire régulièrement de l'eau (Eau d'Hépar par exemple)
Eviter les pâtes et le riz



Limiter les contacts avec les personnes malades
Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin
Boire 1,5L d'eau par jour



Surveiller l'apparition de symptômes



En cas de symptômes contacter un médecin



Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.