

### Qu'est-ce que le vismodégib ?

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement du carcinome basocellulaire

### Où puis-je me procurer mon traitement ?

Disponible en **pharmacie de ville**

### Comment le conserver ?

Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur

**Conserver hors de la portée des enfants**

### Comment dois-je le prendre ?

**En 1 prise par jour**, tous les jours à la **même heure** avec un verre d'eau, en dehors ou au moment des repas



Si vous avez oublié une prise de médicament :

- ne prenez pas la dose oubliée
- prenez la dose habituelle le jour suivant
- noter l'oubli



### Consignes générales



Ne **jamais ouvrir**, ni **sucer** les gélules



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace pendant la durée du traitement et jusqu'à 24 mois après la fin du traitement



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



**N'arrêter jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste**



**Attention** à l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis)

→ **Risque d'interactions médicamenteuses**



Ne pas consommer de pamplemousse (jus ou pulpe)



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **immédiatement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)

### Brochure information Patient

# ERIVEDGE® Vismodégib 150 mg Gélules



## Mieux connaître son traitement



*Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.*

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale

# ERIVEDGE® vismodégib

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

## Principaux effets indésirables potentiels

### Digestif

- **Nausées/vomissements, perte d'appétit, perte du goût**
- **Diarrhées**
- **Constipation**

### Cutané

- **Démangeaisons, éruption cutanée**
- **Perte de cheveux**

### Douleurs musculaires, articulaires

### Fatigue

## Prévention



Faire plusieurs repas légers et éviter les aliments frits, épicés et gras



Eviter le café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus et l'alcool  
Réhydratation



Boire au moins 2L d'eau par jour, alimentation riche en fibres (légumes verts, fruits), éviter les pâtes et le riz, faire de l'exercice physique



Ne pas reprendre la prise si vomissements



En cas de diarrhées importantes contacter un médecin



Consulter un médecin si persistance des symptômes



Limitez l'exposition au soleil, portez des vêtements couvrants, appliquez un produit solaire d'indice/coefficient de protection > 50 avant exposition et toutes les 2 heures si besoin



En cas de réactions importantes, contacter un médecin



Utiliser une brosse molle et un shampooing doux  
Se laver les cheveux à distance de la prise des gélules



S'hydrater fréquemment  
Limiter les gestes répétitifs et privilégier les exercices légers (marche)



Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.